



Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Ordre - Columbiformes

Famille - Columbidae



**Vulnérable en
région PACA**
Chassable



Morphologie

Taille - 29 cm

Envergure - 43 à 53cm


Poids - 125 à 225g



Signes distinctifs

Tâche blanche zébrée de 3 ou 4 bandes noires

Ailes couleur brun-roux constellées de noir



Habitat


La Tourterelle des bois possède des **mœurs forestières pour sa nidification et sa reproduction**. Toutefois elle s'aventure très régulièrement dans **les plaines pour son alimentation**. On la retrouve dans les forêts à proximité de plaines agricoles.



Régime alimentaire

La Tourterelle des bois est **une granivore stricte**. Elle s'alimente dans **les prairies ouvertes directement au sol**, sur les graminées et plantes sauvages. Cependant, l'évolution agricole l'a amenée à consommer plus régulièrement des variétés cultivées.

Cycle annuel



- Hivernage
- Migration
- Période de reproduction
(nidification, ponte, élevage des jeunes.)



Cycle de vie

La Tourterelle des bois est **une espèce migratrice**. Elle passe la **saison froide au sud du Sahara**, et remonte dès la fin avril vers le nord de l'Afrique et la grande majorité des pays d'Europe pour sa période de reproduction. Elle **repart vers ses quartiers d'hivernage entre le 15 juillet et le 15 août**.



Reproduction

2 oeufs

La femelle tourterelle effectuera **deux à trois pontes de 2 œufs** entre le mois de **mai et de juillet**. Les adultes choisissent des **haies ou lisières de forêts touffues pour construire le nid**. Ils sont protégés par des épineux ou des lianes (prunelliers, ronces, clématites, etc.). **La couaison dure deux semaines avant l'éclosion**. Les jeunes sont nourris pendant trois semaines avant de prendre leur envol.



Attention à la confusion



Streptopelia turtur n'est pas le seul représentant de la famille des columbidés sur le territoire français. On y retrouve **trois espèces à la morphologie similaire**. La Tourterelle turque, très commune, peut facilement être confondue du fait de sa couleur et de son chant, moins roulé. Les deux espèces de pigeons peuvent également porter à confusion lors de leur envol ou en raison de leur silhouette.



Tourterelle turque
Streptopelia decaocto



Pigeon ramier
Columba palumbus



Pigeon bizet
Columba livia



Menaces

La principale menace pesant sur la Tourterelle des bois est la **fragmentation et la disparition de ses habitats**. L'évolution des modèles agricoles, favorisant les grandes parcelles et l'utilisation d'outils mécanisés plus imposants, ont fait disparaître de nombreuses haies interparcellaires favorables à sa nidification. L'évolution des paysages et **la fermeture de certains espaces ouverts** ont un impact sur **l'accessibilité à ses ressources alimentaires** naturelles. Cependant, la tourterelle peut ponctuellement se nourrir dans les champs cultivés.



Préservation

Diverses actions efficaces peuvent être mises en œuvre pour favoriser la Tourterelle des bois :

- ☀️ Protéger ses habitats encore présents.
- ☀️ Replanter des haies favorables à sa reproduction.
- ☀️ Maintenir des espaces ouverts pour sa recherche de graines.
- ☀️ Diminuer les quotas de prélèvements.
- ☀️ Décréter une protection stricte de l'espèce.